

Dr Lionel SELAM
Chirurgien-Dentiste

Diplômé de l'Université de Nice Sophia – Antipolis
D.U d'anatomie clinique crano cervico facial (PARIS V)
D.U de parodontologie clinique (NICE)
Attaché d'enseignement hospitalier.
Membre de la société française de parodontologie et d'implantologie

60, Bd. De la plage
06800 Cagnes sur mer
lionel@selam.fr
Tél. 04. 93. 31. 01. 13.

CONSEILS APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

Des interventions chirurgicales peuvent être réalisées en cabinet dentaire.
Ces traitements chirurgicaux peuvent engendrer des suites opératoires variables en fonction de l'intervention, de sa durée, de sa localisation et même selon le patient, quelques principes simples permettront de les limiter.

CE QUI EST NORMAL

- ◆ Le goût du sang dans la bouche peut persister jusqu'à 3 jours.
- ◆ L'ouverture buccale peut être diminuée pendant quelques jours.
- ◆ Un oedème (gonflement) voire une ecchymose (un « bleu ») peut apparaître.

CE QU'IL FAUT FAIRE (sauf indication contraire)

- ♥ **Suivre scrupuleusement la prescription** qui vous a été faite.
Un médicament antalgique (médicaments contre la douleur) vous a certainement été ordonné, prenez le à intervalle régulier pendant toute la durée prescrite.
- ♥ Utiliser le **bain de bouche antiseptique 24h après l'intervention** à la fin de chaque repas, pendant la durée indiquée sur votre ordonnance.
- ♥ **En cas de saignement, appliquer une compresse stérile 15 minutes** en exerçant une forte pression sur la plaie.
- ♥ **Éviter de brosser la zone opérée le jour de l'intervention.** Reprendre dès le lendemain.
- ♥ Pour éviter l'œdème (gonflement), **appliquer de la glace.**
(pas directement sur la peau, mais dans un sac ou dans un gant de toilette).



**En cas de fièvre ou de douleur importante et persistante
Contacter le cabinet au 04 .93 .31 .01. 13**



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- ♠ **Ne pas cracher** car l'aspiration créée peut entraîner un saignement.
- ♠ **Ne pas boire ou manger très chaud pendant 24h**, la vasodilatation des vaisseaux sanguins obtenue pourrait entraîner un saignement.
- ♠ **Ne pas fumer pendant 3 jours** après l'intervention.
- ♠ **Ne pas prendre d'aspirine** le jour suivant l'intervention.
- ♠ **Ne pas réaliser de bains de bouche le jour de l'intervention.**